




Flunitrazepam

Präanalytik	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
Material	<u>Serum, 1 mL</u>
Therap. Bereich	5 - 40 ng/mL
Tox. Bereich	> 50 ng/mL 
Methode	<u>HPLC</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM, GOÄ</u>
Stoffgruppe	Psychopharmaka, Hypnotika
Handelsnamen	<ul style="list-style-type: none">▶ Flunitrazepam▶ Rohypnol
Pharmakologie	Stark wirksames Hypnotikum der Benzodiazepin-Gruppe mit relativ langer Verweildauer (Halbwertszeit 20 - 30 Stunden) bei mittlerer Resorptionsgeschwindigkeit. Bei einer Einzeldosis von 0,5 - 4,0 mg resultieren Plasmaspiegel von 5 - 20 ng/mL. Ab einer Plasmakonzentration von 50 ng/mL sind toxische Wirkungen zu erwarten. Potenziell letal sind Konzentrationen oberhalb 200 ng/mL.