



Ganglionäre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper

Testparameter	Antikörper gegen ganglionäre nikotinsche (ionotrope) Acetylcholinrezeptoren (α 3-Untereinheit).
Material	Serum , 1 mL
Referenzbereich	< 0,05 nmol Epibatidin-Bindungsstellen/L
Methode	RRA
Qualitätskontrolle	Zertifikat
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ Muskuläre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper▶ Autoantikörper (Übersicht)▶ Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	Download
Auskünfte	Immunpathologie
Analysenkosten	EBM, GOÄ
Indikationen	▶ Neurologisch bedingte vegetative Symptome, ausgelöst durch Störungen der Signaltransmission des vegetativen Nervensystems wie z. B. bei schweren orthostatischen Beschwerden oder Störungen der Schweißsekretion.
Immunpathologie	siehe: Autoantikörper gegen ganglionäre Acetylcholinrezeptoren und autoimmune autonome Gangliopathie. Seelig HP Nervenheilkunde: 28, 447-448 (2009) .