



Natürliche Killer-Zellen

Akronym NKZ

Material EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen). Nicht kühlen!

Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.

Referenzbereich

	Erwachsene > 17 Jahre	Jugendliche 6 - 16 Jahre	Kinder 2 - 5 Jahre	Kinder < 2 Jahre
Leukozyten / nL	4 - 9	5 - 13	4,5 - 15	5 - 20
Lymphozyten	/ nL	1 - 3,6	1 - 5,3	2 - 17
	%	20 - 45	20 - 50	40 - 70
NK-Zellen	/ nL	0,05 - 1,05	0,07 - 1,2	0,1 - 1,4
	%	5 - 29	4 - 26	3 - 23
B-Zellen	/ nL	0,07 - 0,83	0,2 - 1,6	0,6 - 3,1
	%	7 - 23	8 - 31	4 - 41
T-Zellen	/ nL	0,6 - 3,1	0,7 - 4,2	1,4 - 8
	%	61 - 85	52 - 78	39 - 85
Th-Zellen	/ nL	0,3 - 2,2	0,3 - 2,1	0,9 - 5,5
	%	30 - 62	25 - 53	25 - 68
Ts-Zellen	/ nL	0,2 - 1,75	0,2 - 1,8	0,4 - 2,3
	%	21 - 49	9 - 35	9 - 32
CD4/CD8 Ratio	0,7 - 2,8	0,9 - 3,4	0,9 - 2,9	0,9 - 6,3

Methode FC

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Zelluläre Immunologie / Immungenetik

Analysenkosten EBM, GOÄ