



Triglyceride

Material	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u> , nicht einfrieren!
Referenzbereich	< 200 mg/dL
SI-Einheiten	<u>Berechnung</u>
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Arteriosklerose - Risikoabschätzung mit Labortests</u> (Patienteninformationen 2005)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>
Erhöhte Werte	akute Leberzellnekrose, akute Pankreatitis, Alkoholismus, Atherosklerosezustand, chronische Pankreatitis, Diabetes mellitus, extrahepatische Cholestase, Fettstoffwechselstörungen vom Typ I, Typ II, Typ III, Typ IV, Typ V, Leberzirrhose, maligne Hypertonie, nach Knochenfrakturen, nephrotisches Syndrom, postprandial, renovaskuläre Hypertonie.
Erniedrigte Werte	A- β -Lipoproteinämie, hereditäre Sphärozytose, Hyperthyreose, Laktosurie, Malnutrition.